# **Instructiekaart** voor ouders of verzorgers over toediening van midazolam neusspray en controle van de ademhaling

**1** Haal de neusspray uit de blisterverpakking.

**2** Houd de neusspray vast door uw duim op het pompje van de neusspray te plaatsen. Uw wijs- en middelvinger zet u links en rechts naast het neusstuk.

**Test de neusspray niet, het kan maar één keer worden gebruikt.**

**3**

- Steek het neusstuk in een neusgat totdat uw vingers aan de vingergreep de neus aanraken.
- De neusspray kan worden toegediend bij patiënten in elke houding, ook als ze liggen.

Bij kleine kinderen is het misschien niet mogelijk om het neusstuk in het neusgat te steken.

- Druk dan de punt van het neusstuk tegen het neusgat aan (door de ronde bovenkant zal het neusstuk altijd iets het neusgat in gaan).
- Zorg dat het neusstuk het neusgat afsluit voordat u de spray geeft.



**4** Druk met uw duim stevig op het pompje. Het pompje blijft ingedrukt na toediening van de spray.



**5** Trek het neusstuk uit de neus.
De neusspray is nu leeg.

**Belangrijk:**
De andere zijde bevat belangrijke instructies voor de controle van de ademhaling na toediening van Midazolam neusspray.

## 6 Leg de patiënt in de stabiele zijligging.

Om epileptische aanvallen te behandelen: rol de patiënt op zijn of haar zij als dat mogelijk is – misschien moet u hiermee wachten tot de bewegingen door de aanval gestopt zijn. Zie uitleg A tot E hieronder.

Als de patiënt op zijn of haar zij ligt, moet u ervoor zorgen dat de mond van de patiënt wijd open is en naar de grond wijst. En dat het hoofd van de patiënt naar achteren gekanteld is.

**Hoe u de patiënt op de zij moet rollen**

**A.** Leg de arm die het dichtst bij u is recht opzij en buig de elleboog.

**B.** Leg de andere arm over de borstkas. Plaats de buitenkant van de hand van de patiënt tegen zijn of haar wang.

**C.** Pak het been vast wat het verst van u weg ligt, vlak boven de knie. Rol de patiënt naar u toe, zodat de patiënt op zijn of haar zij komt te liggen. Ondersteun daarbij het hoofd en zorg ervoor dat de buitenkant van de hand van de patiënt tegen de wang blijft liggen.



**D.** Open de mond (als dat mogelijk is) en zorg ervoor dat de mond naar de grond wijst. Kantel het hoofd een beetje naar achteren.

**E.** De patiënt ligt nu in de goede houding: de hand ondersteunt het hoofd.




## 7 Ademhaling controleren

1. Spreid de vingers van uw beide handen.
2. Plaats één hand op de overgang van buik naar borst en de andere hand op het midden van de rug. Zorg hierbij dat uw vingers richting het hoofd van de patiënt wijzen.
3. Breng uw oor zo dicht mogelijk bij het hoofd van de patiënt en kijk hierbij richting de borst/buik. Kijk, voel en luister gedurende maximaal 10 seconden of er een normale ademhaling is (de buik of de borst komt 2-3x omhoog tijdens deze 10 seconden en u neemt geen hoorbare ruis, rochel of snurkgeluid waar).
4. Herhaal de bovenstaande controles minimaal 2x per minuut.

## 8 Ademhaling niet normaal?

Of epileptische aanval niet gestopt 10 minuten na de eerste neusspray?

**Bel 112** en volg de instructies van de meldkamer nauwkeurig op!

**Wilt u meer informatie over uw medicijn?**
Lees de bijsluiter, scan de QR-code voor de online versie of ga naar www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/bijsluiters/h131604.pdf

**Online bijsluiter**

Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

## 9 Geef alleen een tweede neusspray als u dit advies krijgt.

Gebruik hiervoor dan een nieuwe verpakking en volg de stappen 1 t/m 5 uit de instructies voor gebruik op de andere zijde van deze instructiekaart. Geef de tweede neusspray in het **andere** neusgat.

**Online instructiekaart**

**Wilt u de digitale versie van deze instructiekaart?**
Scan de QR-code of ga naar www.fagron.nl/armm

119822
3007067/3007068/3007069R/02