

Moeite om tabletten of capsules in te nemen?

Slikproblemen komen vaak voor. Vooral kwetsbare patiënten, zoals ouderen en kinderen, vinden het vaak lastig om medicatie in te nemen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 60% van de ouderen moeite heeft met het innemen van tabletten en capsules. **MediSpend™ helpt!**

MediSpend™ vergemakkelijkt de inname van medicatie en maskeert de smaak ervan.



MediSpend™



Licht stroperige vloeistof met citroensmaak die het innemen van tabletten en capsules makkelijker maakt. Geschikt voor iedereen vanaf 2 jaar die zelfstandig kan slikken.

Voordelen



Geen risico op interactie of allergie zoals bij inname van medicatie met voedsel



Zonder suiker: dus veilig en geschikt voor diabetici



Verlaagd risico op maagdarmklachten door de afwezigheid van sorbitol en carrageenan



Geen verlies van het geneesmiddel zoals bij breken of verpulveren



Geschikt bij gluten- en lactose-intolerantie

Moeite met het innemen van medicatie?

MediSpend™ helpt!



Wat is MediSpend™?

MediSpend™ is een licht stroperige vloeistof met een citroensmaak om het innemen van tabletten en capsules te vergemakkelijken. Zowel gehele tabletten en capsules als verpulverde tabletten of geopende capsules kunnen met MediSpend™ ingenomen worden.*

Iedereen **vanaf 2 jaar**, die zelfstandig kan slikken, kan gebruik maken van MediSpend™. De vloeistof is ook veilig en geschikt voor kwetsbare patiëntengroepen, zoals **diabetici en gluten- en lactose-intolerante** patiënten.

Dankzij de carrageenan- en sorbitolvrije formule geeft het gebruik van MediSpend™ **weinig risico op maagdarmklachten**.



Hoe werkt MediSpend™?

MediSpend™ vormt een glibberig laagje rondom de medicatie. Daardoor blijft deze niet in de mond hangen en wordt het transport naar de keel en maag vergemakkelijkt. Bovendien maskeert MediSpend™ de (slechte) smaak van geneesmiddelen.

**Het breken of verpulveren van tabletten en capsules kan de werking van uw geneesmiddel beïnvloeden en leiden tot een verhoogde toxiciteit.*

Overleg altijd met uw apotheker.

Wist u dat...

Het innemen van medicatie met voedsel kan leiden tot een interactie tussen het geneesmiddel en de voeding?

Vooraf **zuivelproducten** vaak interactie geven met het geneesmiddel?

Het breken of verpulveren van medicatie toxische reacties en verlies van medicatie tot gevolg kan hebben?

De citroensmaak van MediSpend™ de slikreflex positief beïnvloedt?

Met MediSpend™ heeft u een veilig alternatief om medicatie in te nemen!



Disclaimer: MediSpend™ is een medisch hulpmiddel. De inhoud van deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie omtrent gebruik, veiligheid, effectiviteit en biologische beschikbaarheid. De inhoud van deze brochure kan niet worden gezien als medisch advies. Apothekers, artsen en medische professionals wordt geadviseerd de informatie naar eigen inzicht te beoordelen. Fagron kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor de informatie in deze brochure. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Z-Index nummer: 16740483

Hoe gebruikt u MediSpend™?

Geneesmiddelen, maar ook vitaminepreparaten en supplementen kunnen met MediSpend™ worden ingenomen. Bruistabletten zijn **niet** geschikt voor inname met MediSpend™.




Leg uw medicatie op een eetlepel



Bedek uw medicatie met 10 ml (twee pompjes) MediSpend™



Neem uw medicatie met MediSpend™ in



Drink water na inname van uw medicatie indien dit in de bijsluiter van uw medicatie wordt geadviseerd